

シバキープ P r o 顆粒水和剤

実際に使用する際は必ず商品ラベルをよく読み、記載内容に従ってお使いください。

農林水産省登録 第 23251 号

農薬の名称 シバキープ P r o 顆粒水和剤

農薬の種類 フルセトスルフロン水和剤

成分

- フルセトスルフロン・・・50.0%
[1-{3-[(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイル)スルファモイル]-2-フルオロプロピル=メトキシアセタート}]
- 鉍物質微粉、界面活性剤 等・・・50.0%

性状 類白色水和性細粒

適用雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		使用方法	総使用回数※
				薬量	希釈水量		
日本芝 (こうらいしば)	—	一年生 イネ科雑草	春夏期芝生育期 (雑草発生初期)	0.06 g/m ²	100 mL/ m ²	散布	3 回以内
		ヒメクグ ハマスゲ	芝生育期 (雑草発生初期)				
日本芝		芝生育期 (雑草発生前～ 発生初期)					
西洋芝 (ハントグラス)		芝生育期 (雑草発生初期)					
西洋芝 (ハーミューダグラス)		一年生 及び 多年生 広葉雑草	春夏期芝生育期 (雑草発生初期)				
西洋芝 (ケンタッキーブルーグラス)							
樹木等	公園 庭園 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 等	クズ	雑草生育初期 (草丈 20 cm 以下)	0.06～ 0.12g/m ²		植栽地を 除く樹木等 の周辺地に 雑草茎葉 散布又は 全面土壌 散布	

※は本剤及びフルセトスルフロンを含む農薬を、年間に同一場所に使用できる総使用回数の制限を示す。

効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 雑草の発生前から発生初期に有効なので、時期を失しないように均一に散布する（効果）
- 周辺の植物にかかると薬害を生じるので、散布の際は芝生の中や付近にある草木や花木、畑作物などに薬液がかからないようその付近での散布はさける（薬害）
- 空容器等は圃場などに放置せず適切に処理する。
- 植栽地を除く樹木等の周辺地で使用する場合は、薬剤が樹木等の植栽地に流入または飛散するおそれのある場所などでは使用しない。また、樹木等有用植物の根が分布していると思われる所では使用をさける（薬害）
- 使用量、使用時期、使用方法を守る。本剤を適用作物群に属する作物又はその新品種に使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認する。なお、病虫害防除所または販売店と相談することが望ましい。

安全使用上の注意

- 眼に入らないよう注意。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける（刺激性）
- 散布時は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをする。【マスク着用マーク】
- 公園、庭園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後（最小限その当日）に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管。

保管・・・密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、子供の手の届かない冷涼・乾燥した所。