アンツハンタープロW粒剤　400g

用　途　　：　殺虫剤
適用害虫　：　クロアリ・シロアリ
性　状　　：　類白色粒剤
有効成分　：　ペルメトリン・BPMC
　　d-T80 フタルスリン
容　量　　：　400g

特　長

■本剤はクロアリとシロアリの体に付着・接触すると殺虫効果を発揮します。
■速効性と持続性を併せ持っているので、クロアリ・シロアリの通り道に散布しておくことで効果的に駆除することができます（約４週間持続）。
■プロも認める優れたシロアリ防除効果を持つ、ピレスロイド系薬剤を配合しています。
■散布用ボトル入りの粒剤で簡単に使えます。
■当社従来品と比較して速効性がアップしました。

使い方

【クロアリに対して散布する場合】
●アリの巣穴周辺及びアリの通路に、１㎡あたり 50~100g 散布してください。
　※目安として容器を傾け一振りすると薬剤が約 3g でます。
●アリの巣穴の周りにまく場合、ドーナツ状に散布すると効果的です。アリの通り道にまく場合は帯状に散布してください。
【シロアリに対して散布する場合】
●シロアリの営巣初期にシロアリのいる土壌に直接散布してください。
　※本剤が雨で流れたり、固まった場合は天候が回復してからもう一度散布し直してください。

使用上の注意

●体調のすぐれない時は散布しないでください。
●植物には直接散布しないでください。
●室内では使用しないでください。
●玩具、ペット、自動車や壁などの塗装面、石材等に薬剤がかからないようにしてください。
●河川や池、水源池に本剤が入らないように十分注意してください。
●散布時は身体の露出部を少なくし、風向きなどにも注意して薬剤を浴びないようにするとともに、できるだけ吸い込まないように注意してください。

●使用後は手を石けんでよく洗い、うがいをしてください。また、眼に入った場合は、直ちに水でよく洗い流してください。
●シロアリが柱や壁の中まで喰い入っている場合は、専門の業者に駆除を依頼してください。
●アリの中には薬剤が付着しても動き回る場合がありますが、数分～数時間後には退治できます。

保管上の注意

使用後は必ず容器のふたを閉めて、食品・食器と区別し、直射日光を避け、子供の手の届かない乾燥した場所に立てて保管してください。

羽アリの見分け方

	見た目	羽	胴	触覚	飛ぶ時期
クロアリ		後羽より前羽の方が大きい	くびれている	くの字型	4～10月頃
シロアリ		羽は細長く4枚とも同じ大きさ	ずん胴で、胸と腹部分はほぼ同じ大きさでつながっている	じゅず型	4～7月頃

使用場所イメージ


庭や花壇の周りに


家の周りに


縁の下に

使用場面