

ネコソギシャワーV6

実際に使用する際は必ず商品ラベルをよく読み、記載内容に従ってお使いください。

農林水産省登録 第24601号

農薬の名称 ネコソギシャワーV6

農薬の種類 グリホサートイソプロピルアミン塩・テブチウロン・ヘキサジノン液剤

成分

- ・ グリホサートイソプロピルアミン塩・・・・・・・・ 0.90%
 [イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート]
- ・ テブチウロン・・・・・・・・ 0.15%
 [1-(5-tert-ブチル-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)-1,3-ジメチル尿素]
- ・ ヘキサジノン・・・・・・・・ 0.15%
 [3-シクロヘキシル-6-ジメチルアミノ-1-メチル-1,3,5-トリアジン-2,4(1H,3H)-ジオン]
- ・ 水、界面活性剤等・・・・・・・・ 98.8%

性状 無色透明水溶性液体

適用雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量 (原液散布)	使用方法	総使用回数*	
樹木等	駐車場 道路 運動場 宅地等	一年生雑草	雑草発生前	50～120 mL/m ²	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布	本剤及びヘキサジンを含む農薬	2回以内
		多年生雑草	雑草生育期	20～120 mL/m ²			
		スギナ		コケ類生育期	40～120 mL/m ²	3回以内	
		コケ類					

*は本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬を、年間に同一場所に使用できる総使用回数の制限を示す。

- 薄めず原液のまま、雑草の茎葉全体にしっかりとかかるように散布するか、雑草が生えている地面に散布します。長期間効かせたい場合は地面に十分量を散布してください。
- コケ類には、コケの表面が十分に湿るように散布します。
- 枯らしたくない植物の周りでは使用できません。



効果・薬害等の注意

- 雑草が大きくなりすぎると効果が劣るので、生育期（草丈 30cm 以下）あるいは雑草を刈払った後早目に使用する。
- 一年生雑草に対して低薬量で使用する場合には、雑草の茎葉にしっかりとかかるように注意して散布する（効果）
- 樹木類等の植栽地に流入または飛散するおそれのある場所等では使用しない（薬害）
- 樹木類等の周辺では樹冠下より 1 m 以上離して使用する。
- 作物の播種または植栽予定地では使用しない（薬害）
- 激しい降雨が予想される場合は、使用をさける。
- 水田や水田への利用が考えられる用水路等に本剤の流入が想定される場所や、農作物および樹木類等有用植物の付近では使用しない（薬害）
- ハウス等の施設周辺では使用しない。 
- 傾斜地や砂質土壌では使用しない（薬害）
- 水源池、養殖池等に本剤が飛散、流入しないように十分に注意する。
- 飛散によって自動車やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意する。
- 散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、空容器、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理する。
- 使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合は、病虫害防除所または販売店と相談することが望ましい。



安全使用上の注意

- 散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。 
- 駐車場、道路などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後（最小限その当日）に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管する。
- 子供の手の届かない場所に保管する。

魚毒性等・・・・・・・・河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意（藻類）

保管・・・・・・・・密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所。
横にしないで立てて保管する。