

# ネコソギシャワーAL

実際に使用する際は必ず商品ラベルをよく読み、記載内容に従ってお使いください。

農林水産省登録 第 24081 号

農薬の名称 ネコソギシャワーAL

農薬の種類 グリホサートイソプロピルアミン塩液剤

成分

・グリホサートイソプロピルアミン塩・・・1.0%

〔イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート〕

・水、界面活性剤、色素等・・・・・・・・・・99.0%

性状 淡青色澄明水溶性液体

## 適用雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	1 m <sup>2</sup> 当り 使用量	使用方法	総使用 回数 ※
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 等	一年生及び 多年生雑草	雑草生育期 (草丈 30cm 以下)	20～40ml (原液散布)	植栽地を除く 樹木等の 周辺地に 雑草茎葉散布	3 回以内
		スギナ		100ml (原液散布)		

※印は、本剤及びグリホサートを含む農薬を、年間に同一場所に使用できる総使用回数の制限を示す。

■ 薄めず原液のまま、雑草の茎葉全体にしっかりと薬液がかかるように散布します。

効果・薬害等の注意

- グリホサートを含む農薬であるので、他のグリホサートを含む農薬の使用回数と合わせ、総使用回数の範囲内で使用する。
- 土壌中で速やかに不活性化するので、雑草の発生前処理効果はない。
- 散布時の雑草の草丈や葉面積が大きいほど効果が確実となるので、散布前に雑草の地上部を刈り払わない（効果）
- 通常 2～14 日で効果が発現し、効果完成までさらに日数を要するので、誤って再散布しない。
- 処理後 6 時間以内の降雨は効果を低下させることがあるので、天候をよく見極めて散布する。
- 植物に薬液が付着すると薬害が生じるので、散布液が付近の農作物、樹木の茎葉に飛散しないように散布する（薬害）
- 水源池、養殖池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意する。
- 散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、空の容器は環境に影響のないよう適切に処理する。
- 使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所または販売店等と相談することが望ましい。

安全使用上の注意

- 眼に入らないように注意。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける(刺激性)
- 皮ふに付着しないように注意。皮ふに付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落とす(刺激性)
- 散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。[マスク着用マーク]
- 公園、堤とうなどで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後（最小限その当日）に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管。

保管・・・密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼な所。  
横にしないで立てて保管する。  
有効年月内に使用する。